

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百十八

詳校官太醫院醫士 臣舒岱

編修 臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士 臣何思鈞

校對官中書 臣石鴻緒

謄錄監生 臣姚希慶

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十八 明 周王朱櫛 撰

諸血門

總論

夫人之所以滋養其身者唯氣與血血為榮氣為衛榮行脉中衛行脉外周流不息五日而復大會陰陽相貫如環無端焉蓋血猶水也水由地中行百川皆理則無壅決之虞血之周流於身上透泥丸下至涌泉灌溉諸

經榮養百脉內不為七情所鬱外不為四氣所傷自然  
順適萬一微爽節宣則血氣逆亂榮衛失度皆於常經  
或澀或散或下而忘返或逆而上行乃有吐衄便利汗  
痰諸證生焉夫血之妄行固由積熱所致然其證多端  
難以槩而論有因飲食過飽負重傷胃而吐者有思慮  
傷心并積熱而吐血衄血者有勞傷心肺又為七情所  
干而咳血吐血者心主血肝藏之而脾為之統過思傷  
脾亦能令人吐血治之須究其因傷胃者調胃安血勞

心者補益其心志血熱則清之氣鬱則順之脾傷則安之  
病之淺惟有早灸膏肓而已至若肺生疽瘡從高墜下  
一應傷折皆能吐血傷寒汗後不解鬱結經絡隨氣湧  
泄吐血衄血又當從各類求之凡心主血肝藏血肺主  
氣血為榮氣為衛六氣不傷七情不鬱榮衛調平則無  
壅決之虞節宣失宜必致壅閼遂不得循經流注失其  
常度故有妄行之患焉夫血之妄行也未有不因熱之  
所發蓋血氣得熱則淖溢血氣俱熱血隨氣上乃吐衄

也大抵寸口脉微而弱氣血俱虛則吐血關上脉微而乳為失血沉細者易治浮大者難治久吐不瘥面色黃黑無復氣血或發寒熱或惡寒者亦難治凡吐血有三種有內衄有肺疽有傷胃內衄者出血如鼻衄又有不從鼻孔出是近從心肺間津液出還流入胃中或如豆羹汁或如切鰕血凝停於胃中因即滿悶便吐或去數斗至一石者是也肺疽者或飲酒之後毒滿悶吐之時血從吐後出或一合半升是也傷胃者因飲食大飽之

後胃中冷則不能消化便煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝臍因傷裂胃口吐血色鮮正赤腹絞痛白汗出其脉緊而數者為難治也問曰病胃脇支滿妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢怠惰目昏眩前後血病名為何何以得之對曰病名血枯此得之年少時有所大奪血若醉入房中氣竭而肝傷故使月事衰少不來也治以烏賊骨鱗茹二味并合丸以雀卵大小豆以五丸為率飯後以鮑魚汁下利腸中及傷肝也凡

吐血後體中但覺奄奄然心中不悶者輒自愈假令煩躁心中悶亂紛紛嘔吐顛倒不安醫工又與黃土湯阿膠散益加悶亂卒至不濟如此悶者當急吐之上焦有邪則傷諸臟臟傷血下入於胃胃得血則悶滿氣逆氣逆故吐血也凡醫人不明發表攻裏亂投湯劑有悞性命更大忌夏月燔灸中脘臍下關元氣海背俞三里等燔灸千百壯者全無一效使病者及受其殃虛勞之疾凡肉食熱麵辛酸之物不可食所可食者菠稜葵菜



水水清涼之物無所禁忌蓋得寒涼滑利腸胃使氣並  
無壅礙燥澁經曰穀入於胃脉道乃行水入於經其血  
乃化若不慎致令病人胃口閉澀則形軀漸瘦此乃  
死之由也但諸人咯膿血衄血大小便血者可服三黃  
丸黃連解毒丸涼膈散加桔梗當歸大黃芍藥犀角地  
黃湯大作劑料時時呷之內經曰所謂邪熱傷於肝心  
之病依此調治萬舉萬全矣人之一身不離乎氣血凡  
病經多日療治不痊須當為之調血血之外證痰嘔燥

渴昏憤迷忘常喜湯水漱口不問男女老少血之一字請加意焉用藥川芎蓬朮桃仁靈脂生地黃北大黃為要嘔甚者多加生薑以此先利其宿瘀嗣茯苓神川芎甘草調理之血隨氣行氣逆而上奔則血不循於經絡而涌吐矣人之吐血出於上焦有熱固也然能用柴胡黃芩蒲黃茅花等輩而不能用枳殼北梗青皮生薑烏梅之類又不能用通利圓子以開其中脘導其大便則氣如何而下降血如何而下行吾恐逆奔而上有不

可得而止之者若夫依前治法血止而後又當以人參  
川芎當歸茯苓橘皮半夏甘草為之調理虛則加朮香  
熱則加柴胡壅則加桑皮荊芥其人脈濇必有漱水之  
證必有嘔惡痰涎之證必有兩腳厥冷之證亦必有小  
腹結急之證或唾紅或鼻衄此皆滯血作熱之明驗也  
用藥不止於柴胡黃芩當以川芎白芷桃仁五靈脂甘  
草佐之大使秘結者於中更加大黃濃蜜使滯一通黑  
物流利則熱不復作

吐血 附論

夫吐血病有三種一則緣心肺蘊熱血得熱則妄行下流入胃胃受之則滿悶氣道賁衝故令吐血二則虛勞之人必肺內傷悲怒氣逆肝不能藏血投虛而出因怒氣逆甚則嘔血三則緣酒食飽甚胃間不安或強吐之氣脉奔亂損傷心胃血隨食出此名傷胃各隨證以治之

方

當歸大黃湯

出千金方

治吐血胃中寒痛

芍藥

乾薑

茯苓

桂心

當歸

大黃

芒硝

各二兩

阿膠

甘草

人參

各二兩

麻黃

一兩

乾地黄

四兩

蟲蟲

水蛭

各八枚

大棗

二十枚

桃仁

百枚

右㕮咀以水一斗七升煮取四升分五服日三夜二

黃土湯

一名乾地黄湯出千金方

治吐血

伏龍肝

雞子大二枚

桂心

去粗皮

乾薑

炮裂

當歸

芍藥 白芷

甘草

炙剉

阿膠

芎藭

各一兩

生乾地黄

八兩焙

細辛

半兩去苗葉

吳茱萸

二升

右咬咀以酒七升水三升合煮取三升半去滓內膠  
煮取三升分三服亦治血衄一方無阿膏空心食前溫  
服

救脉湯

一名人參救肺散出試效方

治吐血咳血

升麻

柴胡

人參

蒼朮

各一錢

當歸稍

熟地黄

白芍藥

黃耆

各二錢

蘇木

半兩

甘草

陳皮

各半錢

右為散作一服水二盞煎至一觥去粗溫服食前

羚羊角湯

出聖濟總錄

治吐血

羚羊角

鎔三兩

伏龍肝

五兩

熟艾

炒一兩

地榆

去土

牛膝

去苗酒浸焙

牡丹皮

去心各二兩

芍藥

剉四兩

阿

膠

炒令燥一兩

栢葉

炙

大薊根

各三兩

鷄蘇葉

一握

蟬蛸

慢火炙黃五枚

右為粗散每服三錢水一盞入生薑半分拍碎同煎

至七分去粗溫服

二神湯

出朱氏  
集驗方

治吐血絕妙治男子婦人吐紅之疾

蓋是久病或作急勞損其榮衛壅滯氣血遂致妄行所致若投以藕汁生地黃等涼劑治之必求其死矣每遇患者用藥甚簡

甘草

炙

乾薑

炮等分

右為末每服二錢水一中盞煎至五十七沸帶熟呷空心日午進之和其氣血榮衛自然安痊不可不知



地黃飲

出千金方

治忽吐血一兩口

乾生地黃

焙五兩

王不留行

牡丹皮

各二兩

赤

芍藥

草薢

各四兩

麥門冬

去心焙

續斷

牛

膝

切焙

阿膠

炙燥各三兩

蟾蜍

研五枚

右粗搗篩以生地黃汁三升水三升并蟾蜍同煎至三升半去粗分溫六服空心食前不瘥更合數劑取

瘥

赤芍藥散

出聖濟總錄

治吐唾血

赤芍藥

當歸

切焙

附子

炮裂去  
臍皮

黃芩

去黑  
心

白朮

甘草

炙剉各  
一兩

阿膠

炙燥  
二兩

生乾地黄

焙乾  
四兩

右為末每服三錢空腹溫酒調下日三服

桑白皮散

桑根白皮

六兩

生薑屑

六兩

栢葉

鷄蘇

各四  
兩

小薊根

五兩

乾地黄

七兩

青竹茹

一升  
新者

地松

三兩

右搗散煮桑白皮飲和一方寸七日再漸漸加至二

三七以竹瀝下亦得

白朮散

出醫方大成

凡吐血咯血鼻衄其得之多因積熱

之甚或飲食過馳騁傷胃絡也不然驚恐悸怒使氣逆上而不下行血隨氣而鬱

積胃間久則吐血咯血鼻衄宜服此行榮衛順氣止血進食退熱惟忌食熱麵煎燂海物猪雞一切發風之物不宜甚飽常令饑飽得所自然胃膈空利氣血順也

昔蘇少連病此極可謂百藥不效偶姜昌傳此方服之遂愈後濟人屢效

白朮

二兩

人參

去蘆

白茯苓

去黑皮

黃耆

各一兩蜜炙

柴胡

去蘆一分

山藥

百合

去心各三分

甘草

炙半兩

前胡

去蘆一分

右剉散每服一錢半水一盞薑三片棗一枚同煎至

六分溫服日三服

茅根散

出經驗良方

治吐血

雞冠花 馬藍菜根 柳枝 楓枝 白茅根

生薑 甘草

各等分

右咬咀以酒一升半童子小便一盞瓦器濟固煮至

一升去滓溫服

雞蘇七味湯 治吐血蓋此病有兩種一者緣墮打損  
內傷而致此病二者緣積熱兼勞而有此病若內傷  
自須依前內損大便血等諸方救之若積累勞吐血  
狀更無餘候但覺心中悁悁似欲取吐背上煩熱便  
致此病宜以此藥及桑白皮散療之

雞蘇

五兩

生地黃

切

青竹茹

各一升

生薑

桑

白皮

各六兩

小薊根

切六合

生葛根

切六合

右切以水九升煮取三升去滓分溫三服服約相去  
如人行十里久若一劑得力欲重合服至四五劑猶  
佳隔三四日服一劑如未定則宜合前桑白皮散服  
之

犀角湯

出千金方

治吐血酒客溫疫中熱毒乾嘔心煩者

蒲黃 犀角 括蕒根 甘草 葛根 桑

各二兩

寄生

各三兩

右咬咀以水七升煮取三升分三服

通聖散

出聖濟總錄

治肺損吐血嗽血

金星石 銀星石 雲母 太陰元精石 陽起

石 不灰木

用等分以甘鍋子一枚先以羅過紫冬灰

即水牛糞是也

可厚

一二寸鋪藥一重以灰一二寸築令實又鋪藥一重

准前以灰蓋後鋪藥盡為度上下以灰封蓋以泥固

濟不限藥多少皆用炭一秤於靜室中周密不通風

處火煨一日一夜候冷取於淨地掘一坑子深一尺

許埋鍋子一宿取出先揀出藥塊子餘以粗羅羅去  
灰取藥碾為末更入乳鉢研令極細即入罐子內收  
之每藥末一兩入龍腦射香各半錢阿膠一分炒同  
研入前件藥末一兩內合和令勻每服一錢或半錢  
以糯米少許細研入薄荷汁各少許同煎為飲候溫  
調下空心日午臨卧各一服

烏金散

出聖濟  
總錄

治吐血及一切血病諸藥不效者

鯪鯉甲

犀角

鎔

黃明膠

赤鯪魚皮

各一  
兩



胎髮

一兩半

獨角仙

一枚去  
起頭足

用瓦藏瓶一枚底下開竅內藥以紙筋泥固濟暴乾用炭五斤簇燒纔候烟絕撥去火放冷取出研細為散每服一錢旋入膩粉少許吐血鼻衄不止新汲水調下產後血暈昏迷悶亂不知人冷醋湯下血氣溫酒調下咯血及血積藏毒下血赤白痢血痢蠱毒痢腸風及五痔下血並米飲調下臨卧空腹服更相度虛實可加至二錢服藥後取下積聚物效

紫蘓散

出聖惠方

治吐血并衄血不止

紫蘇

生乾地黃

各二兩

桂心

當歸

牛膝

去苗

阿膠

搗研炒令黃燥各一兩

右為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓每於

食後溫服之

天門冬丸

出醫方大成

治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬

一兩

甘草

白茯苓

阿膠

各半兩

杏仁

炒

貝母

各七錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一九嚥津含化夜

可十九大能潤肺止嗽

五通散

出聖濟  
總錄

治吐血

巴豆

五十枚  
去皮

白麴

一兩

郁李仁

三百五  
十枚

鹽

豉

三百五  
十粒

伏龍肝

二兩

用鍋子內炒熟不住手攪以烟青為度傾出放濕地出

火毒為末每服半錢溫蜜水調下如患咯血用前件

藥末一兩鄆州蛤粉二兩同研羅細每服一錢薤汁

半盞生油兩點食後調服

阿膠散

出聖濟總錄

治男子婦人咯血吐血

阿膠

炒令燥

白芨 白歛 黃蘗

去粗皮蜜水浸炙赤色各一兩

右為散每服三錢糯米粥飲調下空心食前服小兒量減

竹葉芍藥湯

出聖濟總錄

治吐血衄血大小便出

竹葉

六合

赤芍藥

甘草

炙剉各一兩

阿膠

炙燥三兩

當歸

切焙一兩半

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服  
食後日二服

人參湯 治吐血咯血

人參 川芎 茯苓 半夏 甘草  
製各三分 各一分

右剉每服三錢薑五片煎服

固榮散 治吐血便血

白芷 真蒲黃 甘草 地榆  
兩半 炒一兩 炙三錢 去蘆一兩

右為末每服三錢溫酒調服如氣壯人加石膏半兩

一方用溫湯調服

犀角地黃湯 寸乳血在胸吐血者

生地黃

二兩

黃芩

一兩半

黃連

一兩

大黃

半兩

右咬咀水二觔秤一兩煎至一盞去滓食後服之

烏梅散 治吐血

馬鞭草

二錢

罌粟殼

大者四個 去穰梗

甘草

二錢

大

烏梅

一個

右為粗末每服三錢水一盞半煎至八分去滓日午

空心臨卧服

黃耆散 治吐血

黃耆

剉

白朮

白歛

黃明膠

炒令燥  
各二兩

右為散每服二錢糯米飲調下

絳雲散 治吐血

栢葉

百合

人參

阿膠

炙令燥  
各二兩

右為散每服二錢糯米粥飲調下

煮肺散 治吐血補肺

杏仁

一百二十九粒去  
皮尖新瓦上焙研

百合

四兩

糯米

一合

蔥白

三莖同  
杏仁法

右和勻猪肺一具入藥在內麻線繫沙鍋內煮水去  
一半翻轉令熟竹片切葱藥細嚼蜜湯下服至五具  
為度

艾葉散

治吐血內崩上氣面色如土

乾薑

阿膠

栢葉

各二兩

艾

一把

右咬咀以水五升煮取一升內馬通汁一升煮取一



升頓服一方名栢葉湯不用阿膠小品不用栢葉

瓜蒂散 凡吐血後體中但有奄奄然心中不悶者輒  
自愈假令煩燥心中悶亂紛紛嘔吐顛倒不安醫工  
又與黃土湯阿膠散益加悶亂卒至不濟如此悶者  
當急吐之上焦有邪則傷諸臟臟傷血下入於胃胃  
得血則悶滿氣逆氣逆故吐血也

一名人參湯

瓜蒂

二分

杜衡

人參

各一分

右為末每服一錢或無水醬但得下即可羸人小減

之吐去青黃或吐血一二升無苦

辰膠散 治大人小兒吐血

阿膠

炒

蛤粉

各一兩

辰沙

少許

右為細末和粉紅色藕節搗汁和蜜調下

神效金珠丸 治吐血

丹砂

半兩

金箔

四片

蚯蚓

三条

右先將金箔丹砂研細後將蚯蚓同研和前二味為丸如小皂子大每服一九冷酒下不可嚼

神效散 治吐血咯血一名鹿角膠丸

鹿角膠

炙令燥

黃蘗

去粗皮各半兩

杏仁

四十九枚湯去皮尖麩炒黃

右為散每服一錢用白麵一錢溫水同調下食後再服一方煉蜜為丸如櫻桃大每服一九含化嚥津

金粉湯 治吐血

熟乾地黄

焙

蒲黃

各一兩

芫薺

半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞半糯米十四粒同煎至七分去滓溫服

綿灰散 治吐血咯血

新綿

一兩燒灰

黃明膠

炙令燥

黃蘗

去粗皮蜜炙為末各一兩

右細研每服一錢地黃汁糯米飲相和調下食後臨卧服

金沙湯 治吐血咯血

紫金沙

野蜂窠蒂是半兩

貝母

去心二錢生用

蘆薈

錢一

右粗搗篩每服二錢水半盞入蜜少許煎一兩沸去滓細呷空心食後臨卧服

紫參散 治吐血熱極

紫參

阿膠

炒燥各二兩

甘草

炙剉二兩

右為散每服二錢溫糯米飲調下不計時候

杏蜜膏 治吐血

猪胆

一具用瓷器煮爛冷水浸去膜

杏仁

去皮尖雙入炒

蜜

熬熟各二兩

右同研飯上蒸入木香附子末各二錢和勻成膏每服半匙酒一盞調下日三

藕汁散

出聖濟總錄

治吐血

白茯苓

去黑皮

生乾地黄

焙

蒲黃

右等分為細末每服二錢生藕汁半盞調勻頓服立

止

三物湯

出聖濟總錄

治吐血及大小便血

生地黃

七兩半

阿膠

炙令燥三兩

白鯁

八兩

右㕮咀每服七錢水二盞煎至八分去滓空腹溫服

地黃阿膠散

出聖濟總錄

地黃汁

六合

牛皮膠

一兩細切

生薑

一塊如大梅指搥

右先用銅器中煎十數沸次下牛皮膠煎令消瀝去

生薑分作兩服喫便止或微轉一行不妨

固榮散

出朱氏  
集驗方

治吐血

蒲黃

地榆

各二兩

滑石

四兩

甘草

半兩

右為細末每服五大錢溫酒調下次用後藥

震靈丹

二九

黑錫丹

二十丸

養正丹

十丸

來復

丹

三十丸

黃耆散

出指  
南方

治吐血

黃耆 糯米

阿膠

炒燥  
等方

右為末米飲調下二錢不計時候

治吐血

用枸杞根皮子為散煎服

治吐血咯血

用白膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作灰  
細研每服一錢新米飲調下不計年歲深遠並宜食  
後卧時服



伏龍肝散 治吐血瀉血心腹痛

多年墜壁土 地爐中土 伏龍肝

右等分每服一塊如拳大水二碗煎一碗澄清服白  
粥補之

地黃煎

一名活鱉煎  
出聖惠方

治心經火熱脉洪數或吐或衄

生地黃汁

半升

大黃

一兩

右將地黃汁熬乾一半入大黃末熬成膏圓如桐子  
大以熟水下五丸食後未止加至十丸一方作散溫

地黄汁一沸入大黃攪和空腹服一方每服二十九

米飲下

青香柿

出澹寮方

治吐血

銅青

白膠香

各一錢

右為末入乾柿內濕紙裹煨嚼喫

雲雪散

出聖濟總錄

治吐血

雲雪

寒食麵是

蒲黃

各一兩

右並生用研勻每服二錢冷水調下

香草湯

出聖濟  
總錄

治吐血

莎草根

去毛  
五兩

甘草

一兩  
剉炙

右粗搗篩每服二錢水一盞煎取七分去滓溫服連

進數服

朱粉散

出聖濟  
總錄

治諸般吐血

丹砂

研  
飛

蛤粉

右等分研細合和令勻每服二錢酒調下

黃藥散

一名防己散出  
王氏傳濟方

治吐血咯血

黃藥子 防已

右等分搗為末每服一錢煎小麥湯調下吐甚者一服減二服定

地黃飲

一名地黃煎  
出聖惠方

治肺損吐血不止及舌上或出

血如簪孔

生地黃

八兩研  
取汁

鹿角膠

一兩炙燥  
碾為末

右先以童子小便五合於銅器中煎次下地黃汁及膠末打令勻煎令鎔十沸後作三服當止一方入生

薑汁一方粥米湯飲調二錢服一方專用童子小便

訶梨勒散

出聖濟總錄

訶梨勒

生為末

白麴炒

右等分每服二錢糯米粥調下

白膠散

出澹寮方

治吐血

地黃汁

一升二合

白膠香

兩

右以甕器盛入甑蒸候膠消服

地黃煎 治吐血

地黃汁

生用

藕節汁蜜

右各等分銀鉋兒煎略沸待溫用匙挑入口

補肺散

出衛生寶方

治肺破吐血嗽血治不瘥者

豬肺

一具不破者

雌黃

三錢研細

蒲黃

三錢炒熱

桑白

皮

半兩為末

右三味和勻入白麴少許水調灌入肺內用繩子縛肺口煮熟任意喫之立效

小薊散

治咯血吐血

佛座草

小薊

各等分

右為細末每服一錢用稀粥飲下

栢葉散

澹寮方

治吐血下血其證因內損或因酒食勞

損或心肺脈破血氣妄行血如湧泉口鼻俱出須臾不救

側栢葉

蒸乾

人參

各一兩  
焙乾

右為細末每服二錢入飛羅麪二錢新汲水調如稀糊啜服湧如血泉不過二服即止無前藥用荊芥一

握燒過蓋於地上要出火毒細研如粉陳米飲調下  
三錢服不過二服即愈又無前藥用釜底墨刮下研  
細如粉每服三錢濃前米調下連進二服荊芥穗同  
服

治忽吐血一兩口或是心衄或內崩方

出千金方

用熟艾三鷄子許水五升頓服

血餘散

出聖惠方

治吐血或心衄或內崩或舌上出血如

簪孔者用燒亂髮灰水服方寸匕日三服一方汗鼻



出血用一字吹入鼻中吐血衄血米飲湯調下亦治  
小便出血

又方

出聖  
惠方

治吐血

用桂心末以糯米粥飲調下方寸匕日夜二十服一  
方水湯各半盞濃調趁熱喫南陽趙宣德患服之如  
神其甥亦患二服永安

治吐血憂患絕傷腦膈疼痛及虛勞唾血

用生地黃五觔絞取汁右於銀鍋內微火煎三沸投

白蜜一升又煎取三升每服半升日三主胸痛百病  
久服佳一方治吐血不止用生蜜和調服之一方用  
地黃一升生薑汁一合相和溫服日四五服一方治  
虛勞吐血生地黃五觔搗酒一升煮去滓服

紫苑丸

出指南方

治吐血後咳血

紫苑

去苗土枝梗

五味子

炒各等分

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九含化

治吐血

出百一選方

用松烟墨汁服之

地黃煎丸

出余居士  
選奇方

治吐血遍服藥不效者

用生地黃一觔洗淨細搗取汁其滓再入好酒少許  
又取汁令盡附子一兩半炮去皮臍切作片子入在  
地黃汁內用銀石器熬成膏其附子取出焙乾更用  
乾山藥三兩同為細末却以地黃膏子和成劑木臼  
杵一二千下丸如桐桐子大每服三十九丸漸漸加至  
五十九丸空心米飲下昔葛察判妻苦此疾百藥皆試  
得此方服之取効後雖發屢服有驗

掌中金

出百一選方

治吐血

用真蒲黃黃藥子等分用生麻於手心內調以舌舐

之

藕節散

出經驗良方

治吐血咯血

用藕節研汁調飛羅帶稀服

柳花散

出經驗良方

治吐血

用柳絮不拘多少焙乾碾為細末溫米飲下

治吐血

出余居士選奇方

用蠶蛻子不拘多少燒灰二錢井水調下

青金散

出肘後方

治吐血咯血

用乾蓮葉即經霜敗荷葉最佳用蓮葉燒灰為末二錢飯飲或井花水調下食後及臨卧服一方焙乾為末

治吐血

出經驗良方

用白雞冠花黃醋浸煮七次為末二錢熱酒下

鬱金散

出經驗良方

治吐血嘔血

用鬱金甘草等分為末新汲水調下一錢甚者三服  
愈

荊芥湯

出經驗良方

治吐血咯血

用荊芥連根洗淨搗汁半盞飲之無生者穗為末熟  
水調溫服之

又方

出經驗良方

用黃丹不拘多少細研發時用新汲水調下二錢

龍骨散

出三因方

治吐血鼻衄過多不斷

用龍骨為末以竹管吹半錢入鼻中九竅出血皆可  
用昔有人衄一斛衆方不瘥此方即斷若血從耳出  
亦吹之若時行熱毒血衄者亦斷一方用梔子如前  
法

又方隨鼻左右以新水洗足

茜根散

出聖  
惠方

治大人小兒吐血

用茜根不計多少杵為細末大人每服二錢新汲水  
調下食後一日三服小兒每服一錢或極小每服半錢

或一字一日亦三服一方以淡漿水煎水亦可一方  
水一中盞煎至七分发冷食後服之良

治口中血腥吐血紅咳嗽

用熟地黃乾嚼酒下又為末酒調下

獨聖散

出聖濟  
總錄

治吐血

右用晚桑葉不計多少微焙為細末每服三錢冷臘  
茶調如膏入麝香少許夜卧含化嚥津只一服止後  
用補肺藥



人參湯

出王氏  
博濟方

治吐血咯血

用人參一兩為細末五更雞鳴時打雞子清調如稀  
糊匙抄服若服一兩人參盡甚好不盡半兩亦可服  
訖却卧一方無雞子清一方烏雞子清以手磨成水  
湏磨千百次自然化成後用人參研為細末其每一  
服二錢重調勻約五更服服藥時不得語仰啜下自  
然覺心肺俱涼滿口津液如無烏雞子亦得終不及  
烏雞子如此喫至十日未有不效者

槲葉散

出聖濟總錄

治吐血

右槲葉不拘多少為末每服二錢水一盞煎至七五沸和滓溫服不拘時候

糯米飲

出聖濟總錄

治肺損吐血

用薜荔一二十葉紙包貼放著肉處至乾切不可嚙收貼起如有患旋研羅作細末每服先研糯米濃飲煎若餅麪稀稠可八分一盞抄藥末一匙頭同攪調勻臨卧溫服

黑神散

出聖濟  
總錄

治吐血

用括蕒取端正者紙和泥通裹於頂間留一服煨存  
性地坑內合一宿取出為散每服三錢糯米飲下再  
服之

艾灰散

出聖濟  
總錄

治吐血

用艾不拘多少燒灰細研每服二錢新汲水調下又  
搗自然汁與蜜等分重湯熬為膏服治衄血不止

治吐血方

出聖濟  
總錄

用蛇蛻燒灰研細每服一錢冷熟水調下不拘時候

天南星散

出聖濟總錄

治吐血

用天南星一兩剉如骰子大以炭灰汁津一宿漉出湯洗焙乾為散每服一錢酒磨自然銅調下

又方

出聖惠方

用白藥四兩燒存性以盞蓋地上出火毒為末每服

三錢糯米飲調下

立効方

出聖惠方

治吐血

用側栢葉焙乾如倉卒難乾新瓦焙為末每服三錢  
米飲調食後服一方栢葉加赤土拌勻煉蜜為餅子  
服一方栢葉半觔以水三盞煎取半盞分三服

比金散

出肘  
後方

治吐血熱極并嘔血

用黃蘗一兩塗蜜於慢火上炙焦搗末每服二錢溫  
糯米飲調下一方麥門冬熟水調下

薊葉湯

出聖  
惠方

治心熱吐血口乾

用薊葉及根搗絞取汁每服一小盞頓服

治吐血立效方

出聖惠方

用白蒲薄紙五張灰以水調頓服之

治吐鮮紅方

出聖惠方

用紅綿三寸燒灰研為末水調服一方用紅花

又方

出聖惠方

以烏賊魚骨為散不計時候以清粥飲調下二錢

又方

出聖惠方

右濃煮雞蘇汁飲之以多為妙亦療下血佳

槐花飲

出余居士  
選奇方

治酒毒吐血方

槐花

一合  
炒焦

白礬

五又  
生

右二味研細只作一服水一碗煎至半碗溫服立效

又方

用貝母一兩炮令黃為散不計時候以溫漿調下二

錢

又方

以石榴樹根下地龍糞不限多少細研新汲水一中

盞調三錢飲之

又方

用楮葉搗絞取汁不計時候服一小盞

羊角散 治吐血喘咳上氣者

羊角

二枚  
炙焦

桂心末

二兩

右為末每服二二七日三服以糯米粥調下

麻黃人參芍藥湯 冬居曠室卧熱炕而吐血數次予  
謂此人久虛弱臍有形而有火熱在內上氣不足陽



氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱冬居曠室衣服單薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱大邪不得舒伸故血出於口因思仲景太陽傷寒當用麻黃湯發汗而與之遂成衄血却與之立愈此法相同遂用麻黃桂枝湯

白芍藥

甘草

補肺

黃耆

麻黃

各一錢去其外寒

麥

門冬

人參

各三分益三焦元氣不足而實其表也

五味子

兩個安其

肺氣

當歸

半錢和血養血

桂枝

半錢以補表虛

右㕮咀作一服水三盞煮麻黃令沸去沫至二盞入餘藥同煎至一盞去滓臨卧熱服一服而愈更不再

作一貧者患此病服之立愈

伏龍肝散

治吐血心胸氣急疼痛

方見本嘔血類

地黃湯

治濃血嘔血

生地黃

洗焙

川芎

各一兩

半夏

製

甘草

炙各三分

南星

盪洗七次

芍藥

白芷

茯苓

北梗

前胡

知母

人參

各半兩

右判每服三錢半薑五片烏一個煎服

藕節丸 治傷力吐血

乾藕節

五兩

人參

一兩半

款冬花

乾蓮肉

蛤粉

各一兩

乾山藥

杏仁

各一兩半

棗兒

去核皮半觔

右為細末加大蘿蔔一個煮爛和前藥為丸如梧桐子大每服八十丸白湯下臨卧服忌酒

黃耆散 治吐血此皆由藏氣虛氣上衝所為

黃耆

劉

白芍藥

芳窮

當歸

桂心

黃芩

甘草

炙微赤剉碎  
已上各一两

右為散每服五錢以水一大盞入竹茹鷄子大煎至五分去滓食後溫服

綿膠散 治肺損吐血

新綿

燒灰研

黃明膠

炙燥搗末

右等分研勻每服一錢臨卧糯米飲調下不計年歲深遠並宜食後卧時服

治傷力吐血

用猪肝煮熟蘸白芨末服之

治吐血

益智

生一兩

硃砂

二錢

青皮

半兩

右為細末燈心湯加麝香少許調服

又方

生刺薊

三兩

生地黃

右搗絞取汁入白蜜一兩煎三五沸不拘時候

紅花散 治吐血

紅花

一兩

訶梨勒

三枚連核生用

川樸硝

五兩

右為散每服三錢以酒半中盞水半盞煎至六分去滓入赤馬通一合不計時候溫服

二神散 治吐血便血尿血及婦人血崩不止

香附子

一兩燒存性

蒲黃

一兩炒

右為末每服三錢取大眼桐皮刮去青取白濃煎湯調下一二服立止

地血散 治一切吐血咯血能解一切毒及諸熱繁燥

茜草根

四兩

大豆

一兩

黃藥子

甘草

各二兩

右為細末每服二錢新汲水調下加人參二兩亦治  
痰嗽有血

人參阿膠飲 治吐血

右用糯米二合淨洗煮粥入阿膠一片小者二片生  
薑少許同煎候膠化溫溫入人參半錢攪和不據時  
候服之

四味丸

出十便良方

治吐血

生地黃 栢葉 艾葉 荷葉

等分

右四味爛搗團成雞子大每取一九以水三盞煎至一盞去滓溫服不計時候

阿耨陀丸

出指南方

治先吐血後嗽血

胡椒 小蘗皮 紫檀 鬱金 茜根

各等分

右為細末滴如丸桐子大每服一九阿膠湯化下

又方

出朱氏集驗方

治吐血後應男子失血勞疾後

右用婦人初生男子胎衣以長流水直走不住洗去



惡血待清汁出方妙以酒煮直待爛為度却不用鐵  
器煮止用瓶鉢之類俟其爛取出杵爛如泥次入茯  
神末三五兩又杵覺乾又入酒些少又杵丸如梧桐  
子大每服百十九米飲或酒下或用人參湯於中更  
加茯苓當歸尤妙云服時有些逆人愚見加少麝香  
於中尤妙

並朱  
左方

治吐血

出本  
草

以椰子漿飲之

治吐血

出本草

用鑛墨細研以酒或水調溫服之

治吐血立效

右用生藕搗絞取汁每服一小盞入蜜一匙攪勻服之

卒吐血

附論

夫卒吐血者由心肺二臟壅滯暴熱所傷或飽食飲酒勞損所致也心肺在於上焦俱主於血若為邪熱所傷

則血下脾胃得血則壅悶氣逆故卒吐血也

方

生乾地黃散

出聖惠方

治卒吐血皆因心肺暴熱毒入胃

致吐血不止

生乾地黃

阿膠

搗碎炒合黃燥

甘草

劉生用各二兩

黃芩

栢葉

犀角屑

刺薊

各一兩

右為散每服三錢以水一中盞入青竹茹一鷄子大煎至六分去滓不拘時候溫服

甘草散

出聖惠方

治卒吐血不止

甘草

劉生用

白朮

阿膠

搗碎炒令黃燥

乾薑

炮製劉

黃芩

各一兩

伏龍肝

合

右為粗散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服一方有附子三兩

阿膠湯

出聖濟總錄

治卒吐血不止

阿膠

炙燥

艾葉

焙各三兩

地榆

芍藥

各四兩

薊

根

五兩

右粗篩搗每服五錢水一盞半煎至八分至滓溫服  
雙荷散 治卒暴吐血

藕節

七個

荷葉頂

七個

右同蜜少許搗細水二盞煎至八分去滓溫服或乾  
研為末調服亦可

管仲散

出聖濟  
總錄

治暴吐血嗽血

管仲

一兩

黃連

去鬚  
半兩

右為細散每服二錢濃煎糯米飲調下立止

桂心散

治暴吐血

方見本門吐血類

治卒吐血

出本草

用屋上茅草細剉三升酒浸煮服一升水煮亦得

蒲黃散

治卒吐血

方見本門吐血類

黃連散

出聖惠方

治卒吐血

用黃連末蠟各一兩先鎔蠟內黃連攪勻分為三丸  
溫酒一升和一九服之盡三丸便止一方糯米粥化  
一九服

艾膠散 治卒吐血

用乾薑三兩艾葉二升膠如手掌大水三升煮取一升去滓又內馬矢汁一升合煮取一升頓服即止

治卒吐血

出聖惠方

用生地黃搗絞取汁着瓷碗中膠如兩指大合蒸之於三升米飲不熟適寒一服效

治卒吐血亦療下血

出本草

用桂屑方寸七晝夜含二寸許服千金方同大神驗

治卒吐血及瀉鮮血

出本草

右取小薊葉搗絞取汁溫服

治卒吐血

出本草

以水服蒲黃一升

治卒吐血

出本草

右用向東者蘘荷根一把搗絞汁三升服之

白蘘荷今荆襄

江湖間多種之

吐血不止

附論



夫吐血不止者由心肺積熱飲酒勞傷之所致也肺為上蓋心肺俱主於血若上焦壅滯邪熱傷於諸臟則血下流入於胃中胃得血則滿悶氣逆故吐血也或有飲食大飽未能消化心胸壅悶嘔吐又所食之物與氣上衝心肺傷裂胃腕則令口吐鮮血又有臟腑勞損氣血不和思慮憂愁恚怒氣逆結滯於胸膈之間傷損於肺肝心之臟則血流散故令吐血不止也聖濟總錄論曰臟真高於肺而主氣臟真通於心而主血臟真散於肝而

藏血是三者或因憂愁思慮與夫恚怒氣逆傷之則氣亂而血妄行下於胃胃受之則滿脹其氣衝竅於上者故吐血不止也

方

羚羊角散

出聖惠方

治吐血不止

羚羊角屑

三兩

伏龍肝

五兩

熟艾

一兩

地榆

二兩

牛膝

去苗

牡丹

生乾地黄

栢葉

各一兩

白芍

藥

四兩

蟬蛸

五枚切破慢火炙黃

大薊根

三兩

鷄蘇葉

一兩

右為散每三錢以水一中盞生薑半分煎至六分去

滓溫服

松花散

出聖惠方

治吐血久不止

松花

一兩半

甘草

炙微赤剉

紫菀

去苗

百合

人

參

去蘆頭

白茯苓

茜草根

剉

刺薊

各半兩

艾

葉

一分

薯蕷

鹿角膠

搗碎炒令黃燥

生乾地黃

各一兩

右為散不計時候以粥飲調下二錢

百花煎

出聖濟總錄

治吐血不止欬嗽補肺

生地黃汁升一

生薑汁升半

黃牛乳升半

藕

汁升一

胡桃十枚

研如糊

乾柿

五枚細剉

大

棗

二十一枚煮去皮核

清酒

用一升已上除膠外餘同前七味一處入銀鍋

中煎候沸方下餘二味

黃明膠

炙燥半兩為末用

秦朮末

半兩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒研如糊入煎中三兩

右相次下煎減一半却入上色蜜四兩徐徐煮火養

成煎後入瓷合中盛每日三度服一匙頭糯米飲調

下酒亦得

黃芩散

出聖惠方

治心熱吐血不止

黃芩

地榆

各一兩半剉

元參

茜根

各二兩剉

寒水

石

二兩

麥門冬

二兩半去心焙

川升麻

二兩

犀角屑

一兩

甘草

一兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二七片煎至

五分去滓每於食後溫服

大效聖散

出聖濟總錄

治吐血不止極者

金星石

銀星石

禹餘糧

寒水石

以上并碎

不

灰木 半夏

湯洗七遍去滑  
生薑汁製焙

大黃

剉

蛤粉

右等分為散每服一錢新汲水調更入龍腦少許佳

魚鮮五毒

阿膠散

出聖濟  
總錄

治吐血不止

阿膠

炒令燥  
半兩

生乾地黃

一兩  
焙

人參

一分

黃

藥

去粗皮  
蜜炙

蟬殼

去土

甘草

生剉

黃耆

剉各  
半兩

右為散每服一錢糯米飲調下不拘時候服

麥門冬散

出濟生  
技梓方

治吐血久不愈以三稜針於氣衝

上出血更服

五味子 麥門冬 當歸身 牡丹皮 人參

生地黃

各半錢

黃耆

一錢

右為粗末作一服水二盞去滓熱服

紅藍花散

出聖惠方

治心熱吐血不止

紅藍花

二兩

伏龍肝

一升以水二升半浸取汁

亂髮灰

一兩

甜竹茹

二合

右為散每服三錢以伏龍肝水一中盞煎至六分去

澤頻溫服

紅藍花飲

出聖濟總錄

治吐血不止

方見本門肺臟壅熱吐血類

治吐血不止

出本草

用白膠香不計多少細研為散每服二錢新汲水調

下

治吐血不止口鼻血皆出者

出本草

以藕節搗汁服之良

茜根散

出聖惠方

治吐血不止心腦煩熱



茜根

二兩  
剉

白芍藥

麥門冬

去心各  
三兩

鷄蘇

葉

四兩

小薊根

三兩

青竹茹

四兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓入生

地黃汁一合攪勻不計時候溫服

地榆散

出聖  
惠方

治吐血不止

地榆

淨洗去  
泥土

白芍藥

艾葉

小薊根

各一  
兩

阿膠

三分搗碎  
炒令黃燥

甘草

一分  
生用

右為散每服三錢以水一中盞煎六分去滓不拘時

溫服

栝葉黃耆散

出聖惠方

治吐血日夜不止

生乾地黄

四兩

黃芩

栝葉

甘草

炙微赤  
劉各二兩

阿膠

杵碎炒  
令黃燥

黃耆

劉各  
二兩

右為散每於食後以糯米粥飲調三錢服之

伏龍肝膏

出濟生方

治吐血不止及口鼻俱出

伏龍肝末

生地黃汁

麥門冬汁

刺薊汁

各三合

白蜜

半匙

右相和以慢火熬如稀飭不拘時候含半匙嚥之一  
方無蜜以水調服

刺薊飲子

出聖惠方

治吐血不止

刺薊汁

生地黃汁

生藕汁

童子小便

各二合

赤馬通汁

一合

右和令勻每服一小盞頻頻溫服

苧根散

出聖濟總錄

治吐血不止

苧根

人參

白堊

蛤粉

各一分

右為散每服一錢糯米飲調下不拘時候

栝葉湯

出指南方

治吐血不止

青栝葉

一把

乾薑

三片

阿膠

三片炙

用水二升煮至一升去滓別絞馬通汁一升同和煎取一升綿濾過一服盡之一方無阿膠用艾亦可

人參散

出百一選方

治吐血不止

紫參 人參

阿膠

蛤粉炒成珠

右等分為細末烏梅湯調下

金光散

一名鬱金散

治吐血不止

方見本門  
衄血類

又方

出聖惠方

又以荊芥搗細羅散不計時候以生地黃汁調下二

錢

金花散

出聖濟總錄

治吐血不止

黃蘗

去粗皮塗蜜炙令赤二兩

寒食麴

微炒一兩

黃明膠

炙令燥一兩

右為散每服三錢冷熱水調下食後臨卧服

鼈角散

出聖濟總錄

治吐血不止

鼈角

一兩到  
作片子

蛤粉

一兩鼈角相和於銚  
內炒香令黃色為度

熟乾

地黃

一兩半  
炮令乾

右為細散每服二錢食後臘茶清調下服藥訖可睡

少時

鬱金散

出聖濟  
總錄

治吐血不止

鬱金

一兩

芡實去皮

黃耆

劉各  
一分

右為散每服一錢冷水調下不計時候服

補肺散

出十便  
良方

治暴吐損肺吐血不止

右以成鍊鍾乳粉每服二錢糯米湯調下立止如無糯米只用粳米不拘時候

神效丸

出澹寮方

治吐血不止兼勞心吐血

蓮子心

七個

江米

各半兩

右為細末細墨研濃汁和前二味和丸如梧桐子大每服二十九新水下一方作末酒調服名蓮心散一方湯點服孫仲盈云曾此治人多有得效

二黃湯

出聖濟總錄

治吐血不止

生乾地黄

焙

蒲黃

各一兩

右粗搗篩每服二錢水一盞入竹葉七片煎七分去

滓放冷細呷食後

謂胃散

出聖濟總錄

治吐血不止

黃耆

剉一分

紫背荷葉

焙半兩

右為細散每服一錢生薑蜜水調下不拘時候

白金散

出聖濟總錄

治吐血肺損不止

白麩

九節菖蒲末

各一兩



右研勻每服二錢新汲水調下未止再服如中暑毒

氣生薑蜜水調下

生犀散

出聖濟總錄

治吐血似鷺鴨肝晝夜不止

犀角

二兩鎊屑生用

桔梗

二兩生用

右為散煖酒調下二錢

箬葉散

出聖濟總錄

治吐血成塊不止

箬葉

半兩燒灰

楓香脂

一兩

右為散每服一錢煎黃牛皮湯調下不計時候服

人參散

出聖濟  
總錄

治吐血不止

人參

一分

天茄子苗

半兩

右為散每服二錢新水調下不拘時候

黃耆散

出聖濟  
總錄

治吐血妄行入胃吐血不止

黃耆

半兩

五靈脂

一兩

右為末每服二錢新汲水調下不拘時候

青金散

治吐血不止

以青黛二錢新水調下

治吐血不止

用白馬糞燒研以水絞取汁服一升

黃藥湯

出聖惠方

治吐血不止

用黃藥子一兩搗碎用水二盞煎至一盞去滓溫熱服

槐香散

一名萬金散  
出聖濟總錄

治吐血不止

用槐花不拘多少燒存性研細入麝香少許每服三錢溫糯米飲調下一方不用麝香

治吐血不止

出聖濟  
總錄

用黃櫨木不拘多少剉碎每服三錢以水一盞煎至

六分去滓溫服

如聖散

出聖濟  
總錄

治吐血不止

用上色瓷碗碟為細末打皂莢子仁煎湯調下二錢

連三服立愈

如聖散

出聖濟  
總錄

治吐血不止

用楓香脂不拘多少為細散每服二錢新汲水調下

不拘時

蛛絲散

出聖濟總錄

治吐血

用大蜘蛛網一大塊於銚中炒令黃色研為散以酒調溫下

治丈夫婦人吐血連日不止粥食湯藥不能下者可用五靈脂不夾土石揀精好者不計多少為末研狗膽汁和為丸如鷄頭子大每服一九煎熱生薑酒摩令極細更以少生薑酒化以湯盪藥令極熟須是先做

下粥溫熱得所左手與患人藥喫不得嗽口右手急將粥與患人喫不令太多

治心熱吐血不止

出聖惠方

用生葛根汁半大升頓服一方用葛粉新汲冷水調服

治吐血不止

用管仲研細同生薑汁炒糖井花水調下

立效散

出十便良方

治吐血及鼻衄不止

右以伏龍肝二兩新汲水一大盞淘取汁入蜜一匙攪勻服之一方以水煎服

治吐血不止

出聖惠方

生藕汁

合二

刺薊汁

合十

右件藥合攪令勻入生蜜一匙調和令細呷之

治吐血不止

右蘆荻外皮不拘多少燒作黑灰勿令白為末入蚌粉少許細研麥門冬熟水調下一錢或二錢三服可

救一人

治吐血不定

用川大黃一兩搗羅為散每服一錢以生地黃汁一合水半盞三五沸服之不拘時候

吐血口乾

附論

夫吐血口乾者由臟腑虛竭榮衛不理陰陽隔絕陽虛於上故身體虛熱胸中否澀則口乾也

方



石膏散

出聖惠方

治心胸煩熱吐血不止口舌乾燥頭疼

石膏

麥門冬

去心各二兩

甘草

半兩炙微赤剉

黃芩

川升麻

生乾地

青竹茹

蘇蘇根

葛根

各二兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候放溫服

杏仁散

出聖惠方

治心肺客熱吐血唇口乾燥

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

赤茯苓

黃連

去鬚

梔子

仁黃芩

川大黃

剉碎微炒各一兩

桂心

半兩

蘇

薤分三

右為散每三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

犀角散

出聖惠方

治心肺壅熱上焦不利吐血口乾

犀角屑

黃芩

人參

出蘆頭

生乾地黄

麥門

冬心

薤薤

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

杏仁

二兩湯浸去皮

尖雙仁楚

炒微黃

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候服

生地黄煎

出聖惠方

治肺熱吐血口乾心躁

生地黄汁

一升

生薑汁

一合

白蜜

五合

生麥門冬

汁

三合

白沙糖

三兩

杏仁

二兩浸去皮尖雙仁爛研

右煎成膏不計時候半匙含化嚥津

傷胃吐血

附論

傷胃吐血病者因飲食過度傷胃或胃虛不能消化致  
翻嘔吐逆物與氣上衝臍胃口決裂所傷吐出其色鮮

紅心腹絞痛白汗自流名曰傷胃吐血

方

除濕湯

出三因方

治胃脘着濕鬱於經絡血溢作衄或脾

不和濕着經絡流入胃吐血

茯苓

乾薑

各二兩

甘草

炙

白朮

各一兩

右剉散每服四大盞水煎服頭疼加川芎二錢無止

浴室中發衄

加味理中湯

出醫方大成

治飲食過度傷胃不化致嘔吐

其色鮮紅或心腹絞痛自汗名曰傷胃吐血

人參 乾薑

炮

白朮

各一兩

乾葛

甘草

各半兩

右剉散每服三錢水一大盞煎不據時候溫服去乾葛加川芎治鼻衄理中脘分利陰陽安定血脉

鷄蘇散

出聖惠方

治勞傷或飽食氣逆致卒吐血不止

鷄蘇葉莖

黃耆

剉

甘草

生用

阿膠

搗碎炒黃燥各一兩

乾薑

炮製剉

艾葉

各半兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓入赤

馬通汁一合攪令勻不計時候溫服

五聖湯

出聖濟總錄

治飲食傷肺吐血並嗽血

木香

蜜陀僧

蠶殼

去足

甘草

炙剉各半兩

黃明

牛膠

兩片將一片酥炙一片生剉

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至五分去滓食後良

久溫服

理中湯

出三因方

能止傷胃吐血者以其功最理中脘分

利陰陽安和血脉方證廣如局方但不出吐血證學

者當自知之

人參 白朮

甘草

炙

白薑

炮炙等分

右判為散每服四錢水一盞煎七分去滓不以時服  
或只煮乾薑甘草湯飲之亦效方有官桂去粗皮用

白朮丸

出指南方

治傷胃吐血

白朮

十兩

乾薑


黃耆

人參

伏龍肝

各三兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九米飲下



普濟方卷一百八十八



# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百八十九

詳校官太醫院醫士

臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士

臣何思鈞

校對官中書

臣石鴻緒

謄錄監生

臣姚希慶

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十九

明周王朱櫛撰

諸血門

吐血衄血

附論

夫口鼻之中俱出血者由因勞熱而成是以血者本屬於心經脈流行不暫停滯一關不利百病俱生或有憂悸之所因或有卒驚之所致此皆食飽過度飲酒勞傷壅滯積蓄於心胸熱毒薰蒸於肝肺臟腑既蘊邪熱則

血流散上行故令吐血而致鼻衄也

方

天門冬湯

出醫方大成

治思慮傷心吐血不止

遠志

去心甘草水煮

白芍藥

天門冬

去心

黃耆

去蘆

藕節

阿膠

蛤粉炒

沒藥

當歸

去蘆

生地黄

各一兩

人參

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓溫

服不據時

刺薊散

出聖惠方

治吐血衄血及大小便下血不止

刺薊

白芍藥

白朮

人參

去蘆頭

生乾地黄

鹿角膠

搗碎炒令黃色各一兩

芎藭

桂心

黃芩

各半兩

右為散不計時候以生地黄汁調下二錢

竹茹散

出聖惠方

治吐血衄血此為內損或勞傷所致

青竹茹

白芍藥

芎藭

桂心

當歸

各一兩

生乾地黄

三兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分不計時候

溫服

伏龍肝湯

出千金方

治五臟熱結吐血衄血嘔血

伏龍肝

鷄子大一枚

生竹茹一分

芍藥 當歸 黃芩

芡藟

甘草

各二兩

生地黄

一觔

右㕮咀以水一斗三升先煮竹茹減三升下藥取三升分作三服一方有桂心

人參散

人參 黑豆 燈心 淡竹茹 放棗行 扁栢

腦 茅根 紫萍

右等分㕮咀同煎服或為細末以紅酒調下

地黃散

一名生地黄  
飲出千金方

治口鼻皆出血血上行胸心氣急

及大便出血

生地黄

八兩

蒲黃

一升

地骨皮

五兩

黃芩

去黑心

芍藥

生竹茹

各三兩

右㕮咀以水八升煮取三升七合分溫三服

當歸湯

出聖惠方

治衄血吐血不止心胸疼痛

當歸 乾薑 芍藥 阿膠

各二兩

黃芩

三兩

右㕮咀以水六升煮取二升分三服一方為散以生地黃汁調二錢

扁栢散 治男子血旋

公街草 梔子葉 地竹 扁栢

右等分先將蒜薑水研淺鐘飲之令睡隨後將四件用水二碗煎至淺碗服

黃芩芍藥湯

出醫方大成

治虛家不能飲食衄血吐血方

治鼻

衄

黃芩

白芍藥

甘草

各等分

右咬咀以水二盞煎一盞服一方加生薑黃耆

鬱金散

出聖惠方

治吐血衄血不止

鬱金

木香

飛羅麝

黃蘗

劉各一兩

甘草

一兩半炙

微赤

剉

右為散以生地黃汁一大盞旋拌藥後焙令乾又拌之地黃汁盡為度再搗細為散不計時候煎青竹茹



湯調下二錢

藕汁散

出聖惠方

治吐血衄血不止

生藕汁

生地黃汁 大薊汁

各三合

生蜜

半匙

右和令勻每服一小盞細細令呷之不據時候一方有牛蒡根無大薊根

蒲黃飲 治吐血鼻衄不止

糯米

炒

蒲黃 青黛 白麴

各一兩

右為末水調五錢服

麥門冬飲子

出聖惠方

治吐血衄血至一斗不止者宜服

生麥門冬汁

五合

生刺薊汁

五合

生地黃汁

五合

右相和於銀鍋中略煖過每服一小盞調伏龍肝末

一錢服

茅蘇湯

出直指方

治吐血衄血

茅花

三錢

紫蘇莖葉

二錢

右剉為叟咀以新汲水一碗煎至七分去滓乘熱調

生蒲黃二錢漸漸服仍以蒜兩顆煨熟槌扁貼敷兩

脚中心少頃自覺胸中有蒜氣其血立止若下部出

血可以煨蒜敷手心尤佳

白芍藥散

出肘後方

治咯血衄血

白芍藥

一兩

犀角末

一分

右為末新汲水服一錢以血止為度

鷄子白丸

出聖惠方

治吐血衄血

鷄子白

三個

好香墨

二兩

右搗蜜為末以鷄子白和丸如梧桐子大不計時候

以生地黃汁下十丸

蛤粉散

出百一選方

治吐血兼治衄血

右用蛤粉白膠香等分以好松烟墨汁調服

胡黃連散 治吐血衄血

生地黃

胡黃連

各等分

右為末用猪膽汁為丸如梧桐子大每服五十丸臨卧煎茅花湯送下

茅花湯

出百一選方

治吐血衄血

用茅花不計多少煎湯服

治吐血衄血不止

用乾石榴皮末吹鼻立止

蘿蔔飲

一名萊菔飲  
出楊氏家藏

治諸血熱吐血衄血

用生蘿蔔取汁半盞入白鹽少許服之立效如無生  
蘿蔔只用蘿蔔子一分微炒紫蘇葉莖半分剉散用  
煎亦效一方用蘿蔔汁入鼻中

治吐血鼻紅

用生薑一分搗絞汁並壯健丈夫便一升乘熱頓飲

治吐血鼻衄

用茅香花煎湯服之

又方

用陳紅米泔水一鍾溫服

三豆湯

出朱氏  
集驗方

治飲酒太過衄血吐血起則無事睡

則甚服諸藥不效服此而愈

烏豆 赤小豆 菜豆

右各等分渾水服

瀉心湯

一名三黃湯  
出澹寮方

治心氣不定吐血衄血

大黃

三兩

黃連

黃芩

各一兩

右㕮咀以水三升煮取一升頓服之宜食前通口服  
亦能治霍亂之疾神效加生地黃清水煎四服大便  
通利便愈或曰心氣不足可更瀉乎仲景曰若心氣  
獨不足不當有衄血也必邪熱因心不足以容之故  
吐血衄也以苦泄其熱則以苦補其心蓋兩全之有是

證者無不取效量虛實與之

治吐血衄血

出危方

用山梔子燒灰穀醋調服一方用梔子甘草每服三錢煎五分溫服

黃芩散

出聖惠方

治吐血衄血或發或止皆心臟積熱所

致宜服

用黃芩一兩去心中黑腐為散每服三錢以水一中盞煎至六分不計時和滓溫服



療衄血一月者肘後方去暴驚所為

出聖惠方

以刺羊血熱飲之即差一方新羊血慎勿刺羊取血  
神道不祐當無差也

鼻衄

附論

夫脾移熱於肝則為驚衄脾土也肝木也木本剋土今  
脾熱為土氣翻盛逆往乘木是木之虛不能制土故受  
脾之移熱也肝之神為魂而藏血虛熱則魂神不定故  
驚也凡血與氣內榮臟腑外循經絡相通而行於身周

而復始血性得寒則凝澀熱則流散而氣者肺之所主也肺開竅於鼻熱乘於血則氣亦熱也血氣俱熱血隨氣發出於鼻為衄也診其寸口脈微芤者衄血脈微苦寒為衄血也寸口脈微弱尺脈澀兼弱而弱為無血必厥其人微嘔夫當眩不眩而及頭痛痛則為實下虛上實必衄也肝脈不和為衄脈陰陽錯而浮必衄血脈細而數及在上法當吐而不吐其面頰上小赤眼中白睛上目有細赤脈如髮直趣至黑瞳子者當衄病人面無

色寒熱脈沉絃者衄也發從春至夏為太陽衄從秋至冬為陽明衄連日不止者其尺脈必勁勁則睛上浮白白上浮黃若目睛明慧而僅衄血未止脈滑小弱者生實大者死衄血而脈小滑者生大躁者死鼻衄脈沉細者生浮大而牢者死養生方云思慮則傷心心傷則吐血衄血也孫思邈曰鼻頭衄者亡血設令微赤非正者死病人色白皆亡血也凡時行衄不宜斷之如一二升以上恐多者即以龍骨末吹之即愈以至九竅血俱出

者謂之大衄膽移熱於腦熱盛則陽絡溢陽絡溢則衄  
出血汗者謂之衄衄治法各有方

方

剋效方

出聖濟  
總錄

治鼻衄

甘草

炙  
剋

桑耳

焙各  
三分

枳殼

去穰  
麩炒

大黃

剋炒  
半兩

麥門冬

去心  
焙

槐實

炒各一  
兩半

白芷

鷄蘇葉

百合

黃耆

剋

白前

連翹

檳榔

各一  
兩剋

薑黃

二  
兩

右搗節每服五錢水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

鷄蘇丸

出如宜方

治肺熱腦中鬱熱衄血兼治血淋吐血

口臭等證

方見本門諸失血類

治鼻衄及暴下血

出本草

右煮白茅針服之成白花者功用亦同針即茅筍也

治衄血

出本草

用車前葉生研水解飲之甚善

治鼻衄

出本草

以椰子皮煮汁服之

伏龍肝湯

一兩

治鼻衄

伏龍肝

半兩

芍藥

一分

細辛

去苗葉半兩

白芷

乾薑

炮

芍藥

甘草

炙

吳茱萸

湯浸一宿與大豆同炒去

豆各

一兩

右粗搗篩每服三錢酒一盞煎至七八分入生地黃汁一合更煎一二沸去滓溫服日三一方酒水同煎

門冬飲子

一名人參飲  
出試効方

治脾胃虛弱氣促氣弱精神短

少衄血吐血

人參

五錢

黃耆

二錢

五味子

五錢

芍藥

一錢

甘

草

一錢

紫苑

一錢半

方不用

當歸身

麥門冬

右㕮咀分作二服每服水一觔八分煎一觔去粗稍

熱服食後一方無紫苑

比金丸

治邪熱上攻鼻衄煩悶

鬱金

雪水煮令透  
切爆乾一兩

白茯苓

去黑皮

白石英

紫石英 水銀

各一分

甘草

生劉一分

龍腦

研半錢

黑鉛

半錢與水銀銅錫炒

右除炒子外搗研為末用黃牛膽汁和丸如彈子大  
每服一九煎甘草湯放冷磨下

伏龍肝散 治五臟熱結鼻衄心胸煩悶

伏龍肝

當歸

赤芍藥

黃芩

各二兩

犀角屑

刺薊

各一兩

生乾地黄

三兩

右為散每服五錢水一大盞入青竹茹一鷄子大煎



至五分去滓溫服

加味理中湯 治飲酒過多及痰炙燂熱食動血發為

鼻衄

人參 白朮 甘草

炙

乾薑

炮

乾葛

川

芎

各等分

右為散每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

蒲黃散 治鼻衄

蒲黃 栝子仁

研

當歸

切焙

阿膠

炙燥

榿櫚

燒存

性研

亂髮灰

研各一錢

右搗研為散每服二錢生藕節自然汁調下如肺損吐血用地黃自然汁調下腸風下血用糯米根皮煎湯調下婦人帶下艾湯調下

生地黃湯 治上熱衄血

生地黃

洗酥二兩

阿膠

炒酥一兩

川芎

北梗

蒲

黃甘草

生各半兩

右剉碎每服三錢水煎熟入生薑汁二匙溫服

麥門冬散 治鼻衄

生地黃

錢三

生麥門冬

錢三

生薑

錢一

白藥 蒲

黃

錢各二

白蜜

合二

右搗細以井水二大碗煎七分分兩服

止衄散 治氣虛發衄無比神效方

黃耆

錢六

赤茯苓

白芍藥

當歸

生地黃

阿膠

錢各三

右為末每服二錢煎黃耆湯下為剉散亦可

生地黄湯 治鼻衄

生地黄

八兩

黃芩

一兩

阿膠

甘草

各二兩

栝

葉把

右㕮咀以水七升煮取三升去滓內膠煎取二升半  
分三服

睡黃散 治鼻衄

芡實

一兩半

雄黃

研

馬牙硝

甘草

生剉各半兩

牛黃

研一錢

右為散每服二錢用猪膽汁與新汲水調下相次便睡微有汗出為效如時氣黃發舌脹咽喉腫及熱極者如前法斟酌多少服之

黃連散 治大人小兒熱氣盛熱乘於血血隨氣散溢於鼻者謂之鼻衄血得寒則凝澁結聚得熱則流散妄行

黃連 黃栢 栢葉 甘草

各等分

右為末每服二錢水一盞豉二十粒煎五分溫服

涼血地黃湯 治榮中有熱及肺壅鼻衄生瘡一切丹毒

生地黃 赤芍藥 當歸 川芎

各等分

右咬咀水煎去滓量大小加減鼻衄加蒲黃生瘡加黃芩丹毒加防風

川芎三黃散 治實熱衄血

大黃

濕紙裏蒸

川芎 黃連 黃芩

等分

右為末每服二錢井水調服食後

三奇散 治衄血不止

亂髮灰

錢一

人中白

錢半

麝香

一字

右為細末鼻內嚙少許立止一方不用麝香以髮灰  
人中白為末湯調服立止

龍麝散

治鼻衄

伏龍肝

兩半

麝香

錢一

羊脰炭皮

拍碎炒令  
通赤一兩

右細研如粉每服二錢冷水調下或研小蘗汁調下  
亦得

明膠散 治肺積熱極衄血吐血一名伏龍肝散

方見本門

肺臟壅熱  
吐血類

傳效方以竈下黃土吹斷又取井底青泥封面上數

易之

又方

生地黃

三兩研  
取汁

生薑

半兩研  
取汁

阿膠

半兩杵碎  
炒令黃燥

為末

右以生薑地黃汁入阿膠末和勻於銀器內煖過漸



漸服之兼治吐血

又方

出聖惠方

豉

二合

艾葉

如鷄子大

鹿角膠

二兩杵碎炒黃燥

右以水二大盞煎取一盞二分分三服徐徐服之

地金湯

出聖濟總錄

治鼻衄

生乾地黄

焙

生乾藕節

各二兩

右細剉如麻豆每服三錢水一盞煎至六分去滓食

後臨卧溫服

玉塵散

出聖濟總錄

治肺癰鼻衄

白麩

砒葉灰

各三錢

右研令勻分為三服食後井花水調下

刺薊湯

出經驗良方

治鼻衄

大薊根

一兩

相思子

半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓放冷服

地龍散

出肘後方

治鼻衄及膈上盛熱

乾地黄

龍腦薄荷

各等分

右為細末冷水調下

又方

出危氏方

槐花

烏賊魚骨

各等分

右半生半炒為末入鼻

又驗方

出肘後方

以白茅新生腹中裹白胎長五六寸者取一握五升  
水煮取一服又芍藥末吹鼻中

又方

出千金方

治鼻衄

以冷水淨漱口含水以蘆管吹二孔中一方冷水麪漿調服

又方

出千金方

以亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止益之吹以血斷止并水服方寸匕甚者日夜二已困不識人者服亦佳一方用好墨入點法醋并水調下

又方

出千金方

取人屎尖燒灰水服并吹少許鼻中止一方於五月

五日修同上

又方

出千金方

又濕布薄胸止

又方

出千金方

又淳酢和土塗陰囊上乾易之

又方

出千金方

以韭根葱根取汁滴鼻中着一棗大肉鼻少時更着兩  
三度瘥葱白搗汁亦得

白芨散

一名世寶散  
出三因方

治鼻衄立效嘔血咯血肺損或

食飽負重得者服之愈

用白芨不據多少為末冷水調用紙花貼鼻塞中效  
一方用雪水調如無以新汲水調自兩眉際傳至鼻  
上以編子緊繫頭摺紙繫令緊時蘸冷水挹藥上飲  
項即止去藥

又方

出千金方

用黃膠即阿膠盪令軟貼鼻塞中鼻頭至

頂及髮際三寸止一方鎔膠糊鼻帛貼額上仍末雄

黃綿裹內下部治舉身熱衄

畫粉方

出瑞竹堂方

治鼻衄血出不止一二服除根

用白土即畫匠所用畫粉極細研每服五錢新汲水

調服止

治鼻衄

出經驗良方

治大人小兒鼻衄乃血熱不循經而

壅從鼻出也血隨其方氣而肺主氣外屬鼻故出血也

以春冬衄者用生地黃研取汁加蒲黃少許砂糖并

花水調和侵服之愈秋夏衄者用車前草研取汁同生薑汁蜜并花水和飲之即愈先用滓塞兩鼻四時衄者生蘿蔔搗汁同生薑汁蜜和井水調飲之良四時皆可生蘿蔔汁仰頭滴入鼻中即止

又方

出經驗良方

用伏龍肝不計多少為末以荊芥汁調下即止

又方

用鷄脚草接水喫以滓塞鼻



又方

出經驗良方

用白藥煎對碎燒灰存性大紅棗對碎燒灰存性二味為糯米飲湯溫服一方煎湯洗鼻頻縮藥入鼻

又方

出經驗良方

以青黛為丸用肥棗開劈去核入青黛在內濕紙包慢火煨一晌待冷細嚼新汲水吞下

治鼻中出血

用茅屋上青苔曰屋油以新汲水研一盞浮萍與服

其血立止

枇杷葉方

用枇杷葉去毛焙乾為末用茶調下一二錢日三亦

治鼻赤

治鼻衄血

以左臂血用紙撚血點左眼右亦如之

又方

以好麻紙撚絰鼻中頃之打嚏即愈此方甚奇有人

一夕常衄盈盆百藥不效用此遂愈

治衄血

以燈盞數枚以百沸湯煮逐枚漉出乘熱安頂上冷即易之又蒲黃二錢先用新汲水調下老人不用次用米腦細研以熱馬糞汁調上件腦子用鷲毛羽掃入鼻中立止馬糞熟即有汁冷無汁又赤芍藥末冷水調服又五倍子一兩為末新綿燒灰等分米飲調下譙知閭患病用此而愈

搐鼻方 治鼻衄

用駝糞不以多少用新藏餅一箇打開底入糞在內  
燒成灰取出研細用麝香少許研勻隨衄血鼻搐之  
一方無麝香為乾末搐鼻中

防已散 治鼻衄

用防已三兩三搗羅為散每服二錢新汲水調下老  
兒酒調一錢服更用熱湯調少許鼻中嗅氣佳亦用  
糯米飲調下

烏沙散

一名香  
黑汁

治鼻衄

用細烟香墨二兩為細散每服一錢臘茶清調下或  
濃磨以葱白蘸塞鼻中或點入鼻內亦可一方葱汁  
磨墨滴鼻中

吹鼻方 治鼻衄吐血

用栢葉石榴花為細末每用少許吹鼻中亦用花片  
塞於鼻中止

貼背膏 治鼻衄

用京三稜大者一枚以濕紙裹於慢火中煨熟兼熟  
搥碎搗為細末醋煮麪糊調貼背第五椎上

貼鼻方 治鼻衄

用鹿角膠不計多少以沸湯浸軟貼鼻拗上更以醇  
麪調令稀稠得所若左竅出血則塗右邊右竅出血  
則塗左邊

劄耳方 治鼻衄

用延胡索為末以綿裹劄耳內左衄劄右右衄劄左

左右俱衄則兩耳俱劄

葱白汁 治鼻衄血

用葱白一握搗絞取汁投酒少許點兩點入鼻差

衄血方

用川鬱金末井水調下亦治吐血

又方

用槐花半生半炒末入鼻

一方治鼻衄

以鯉魚鱗炒成灰研為末冷調下一二錢一用頭髮  
燒灰嚙入鼻內先口嚙水即止

治鼻衄方

本草

用鉛白霜為末取新汲水調二字

治鼻衄出血不止心悶欲絕

用乾薑削令頭尖微煨塞鼻中

又方

用麻鞋鞵底燒灰吹鼻孔中立效亦治鼻塞



止鼻衄

草本

用香薷乾末以水服之

治鼻衄出血兩頭不止謂之血汗

以新汲水磨黃藥子一椀勿令絕稀頓服立瘥

又方

用藕節取汁服之或滴入鼻中

又方

用故屏風紙燒灰細研溫酒調下一錢立止

又方

用貝母二兩炮黃搗羅為末以漿水調二錢服良久再服

又方

用穀精草為末以熱麪湯調下二錢

治鼻大衄有效

右用貫衆根為末調服一錢七止鼻血有效

治鼻衄

右用刀刮指甲末吸入鼻內即止

治卒鼻衄

出聖  
惠方

右取水一罐鑽底作小孔令射病人頂上名音門以  
新汲水四五罐即止音門立頂後宛中淋不過一兩  
罐即止

又方

出肘  
後方

右水和粉一升如粥飲之立差

又方

出千  
金方

右綿裹白馬矢赤馬矢亦好塞鼻又新馬矢悉可用  
甚者飲汁一二升無新者水浸乾者用新屎汁灌鼻  
中亦效一方用赤馬通

又方

出肘  
後方

右苦酒漬綿塞鼻

又方

出肘  
後方

右左孔衄縛右足小指右孔亦如之兩孔衄皆縛

又方

出聖  
惠方

療人少小衄鼻衄小勞輒止及大人小兒鼻衄血犯  
着便出者用桑耳不計多少炒令焦搗下每衄發輒以  
杏仁大塞鼻數度即可斷

又方

出聖  
惠方

右以鹽半兩炒碾為末分為二服以冷水調下未止

更服

又方

出聖  
惠方

右以槲葉搗絞取汁每服一小盞頓服即止

又方

出聖惠方

右以胡粉炒令光黑以醋調一錢服之即止

又方生地黃湯

出千金方

治鼻衄昏迷不省昔有婦人經

血半年不行因見地黃汁飲數盃後即通利是知地黃治血甚驗

又生地黃三五觔取汁使患者生喫吸汁三觔許又以其滓塞鼻湏臾血止服汁尤佳一方用一兩細剉於銀石器中以酒一中盞煎三沸去滓頓服其血立止

一方煮服之忌酒炙且服粳米朱氏集驗方云昔汝州牧因驗屍有保正趙溫不諳屍所問之即云衄血以數斗昏困欲絕遂使之扶掖以來鼻血如簷溜平日所記治衄數方即合藥治之血勢皆衝出謂治血莫如地黃遣人尋生地黃得十餘觔不暇取汁因使之生喫漸及三四觔又以其滓塞鼻湏臾血定後子婦吐血有醫者教取生地黃自然汁煮飲之日服數升三日而愈昔有一婢病經血半年不通見釜中飲

汁以為棄去可惜輒飲數杯隨即通利地黃活血其功如此地黃但用新布拭之淨搗汁勿用水洗

立效散

一名龍骨散  
出聖惠方

治鼻中衄血及咯吐血不止

用龍骨一兩搗碎以水一大盞煎至半盞溫溫盡服一方用五色者煨研細末吹一豉豆許鼻中立止

又方

出聖  
惠方

用生葛根搗取汁每服一小盞三服即止

又方



用垣衣搗絞取汁每服一小盞頻服

吹鼻散

出聖惠方

治鼻卒血

用釜底墨細研以少許吹鼻中即止

塞鼻散

出聖惠方

治鼻衄

用蝟皮一枚燒灰細研每服半錢綿裹內鼻中數易

之

一方燒末吹鼻中

又方

出聖惠方

用蒼耳莖葉搗絞取汁每服一小盞頻服

又方

出千金方

飲小薊汁良一方用根生搗汁飲

止鼻紅水

出肘後方

右調決明子貼腦心

黃耆芍藥湯

出試効方

治衄血多歲面黃眼澁多眵手麻

木

黃耆

三兩

炙甘草

三兩

升麻

一兩

葛根

半兩

羌

活

半兩

芍藥

一兩

右吹咀每服三錢水二盞煎至一盞去滓溫服之十五服而愈六脉細弦而瀉按之空虛其色必白而兼不澤者脫血也此大寒證以辛溫補血益血以甘溫甘熱滑潤之劑以佐之則愈此亡血亦傷精神

七蒸方

出朱氏集驗方

治鼻衄

鹿茸

七兩分七處蒸

酸棗仁

半兩去殼

石蓮肉

半兩去心

白

茯苓

一兩

兔絲子

一兩淨洗

肉蓯蓉

一兩

益智仁

一兩

去殼

北茴香

半兩青鹽拌勻

右將鹿茸切片半分作七味用碗七隻各蒸一味以  
好酒一升每處用藥一味同浸一宿連碗排飯上蒸  
飯熟取出為度和勻焙乾為末以山藥十兩煮糊為  
丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸至一百丸棗  
湯下

獨聖散

出朱氏  
集驗方

治鼻衄

用鏡面草又名螺曆草水洗搗爛入酒濾去滓取汁  
服

枯骨丸

出指南方

治吐血衄血

烏賊魚骨

蘭茹等分

右為細末雀卵和丸小豈大每服五丸鮑魚汁下

阿膠散

出指南方

治陰虛衄血

黃耆 白朮

桔梗

甘草

山藥

阿膠

各等分

右為粗末每服五錢水二盞取一盞去滓服

煎金散

出指南方

治鼻衄

右煎金花蓮莖葉不計多少陰乾用濃煎汁溫服立

效

治衄血四方

出十便良方

一喫生葱四五莖淬赤大頭一箇於醋中時時啜之  
一滴水於硬地上磨大蒜作泥膏隨左右貼脚心立  
止仍以冷水便洗令淨

一紫紙實塞耳中此方取法於酒注也

一搗諸葛菜或水蘇或蘿蔔菜取汁喫一盞

治鼻衄

出本草

用粟米粉水煮服之

鼻衄方

出本草

以桔梗為末水服方寸七日四五亦治吐血

治鼻紅

出本草

以白茅香花塞鼻中

治鼻衄

出本草

以珊瑚末吹鼻中

止衄

出本草

用草麻葉油塗炙熱熨顙上

治鼻衄

草出本

以金鎗小草葉按碎付之又風化石灰杵為丸日乾

臨時刮敷山根上

治鼻衄

草出本

右取壁錢蠱汁點鼻中乃壁結網蜘蛛如錢圓者是也

又方

出旅善  
備要方

治鼻衄



右取青蒿塞鼻中即止

治鼻紅吐血淋疾

出本草

右以船底苔并炙甘草豉汁濃煎湯旋呷

治鼻衄出血數升不知人事

右石榴花與栢葉等分為末吹鼻中

鼻血不止

附論

夫榮氣之行常與衛氣相隨則氣與血未嘗相離肝藏血肺主氣榮衛和平則氣血順治若人腑臟有熱乘血

氣血性得熱流溢妄行而肺開竅於鼻故其發於鼻衄  
鼻衄不止者臟虛血盛故也內經又云脾移熱於肝則  
為驚衄蓋脾土也肝木也今脾移熱於肝則木不能克  
土肝臟血其神魂悸故成衄血之病

方

鷄蘇飲

出聖濟  
總錄

治衄血不止

鷄蘇

白茯苓

去黑皮

射干

各一兩半

白芷

桔

梗炒

天門冬

去心焙

當歸

切焙

大黃

剉炒

甘

草

炙各一兩

桂

去粗皮半兩

右咬咀每服二錢以水一盞生薑三片煎取六分去

滓空腹溫服

紫參湯

出聖濟總錄

治鼻衄不止

紫參

蒲黃

生地黃

各二兩

黃芩

去黑心

赤芍

苓

去黑皮

赤芍藥

當歸

焙各一兩

甘草

炙一兩半

右剉如麻豈大每服三錢水一盞入阿膠二片炙令

燥同煎至七分去滓溫服不據時候

刺薊湯

出聖濟  
總錄

治鼻衄不止

刺薊

黃芩

剉炒

赤芍藥

各三分

大黃

剉炒

蒲

黃

二兩

側柏葉

四兩

生乾地黃

焙

甘草

炙剉各五兩

右為粗末搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

若急以新汲水調下

刺薊散

出聖  
惠方

治鼻衄血出經日不止

刺薊

苦參

黃連

去鬚

梔子仁

生乾地黃

川大黃

剉碎  
微炒

側柏葉

各一兩

右為散每服五錢水一大盞入青竹茹半鷄子大煎至五分去滓溫溫頻服

茜根散

出聖惠方

治鼻衄日夜不止面無顏色昏悶

生乾地黄

半兩

赤芍藥

三分

栢葉

一兩

阿膠

半兩  
杵碎

炒黃  
燥

當歸

半兩

赤茯苓

三分

右為細散每服煎黃耆湯調下二錢

蒲槐散

出聖濟  
總錄

治鼻衄不止

蒲黃

槐花

各半  
兩

防己

人參

各一  
分

右搗研為散每服一錢新汲水調下食後服

子苓散

出聖惠方

治鼻衄不止

子苓

一兩

蒲黃

伏龍肝

青竹茹

各三分

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓入生藕汁

一合攪勻溫服

地黃丸

出千金方

治鼻出血不止

乾地黄

梔子

甘草

等分

右治下節酒服方寸匕日三如鼻疼者加豉一合鼻

有風熱者以葱汁和丸如梧桐子大五丸

麝香散

出醫方大成

治鼻衄不止

白礬

枯過另研半兩

麝香

另研半字

白龍骨

粘舌者另研半兩

右令勻每用一字先令冷水淨洗拭去鼻內血漬然後吹藥於鼻中或以軟止濕過蘸藥鼻內尤妙

麝香散

出聖濟總錄

治鼻血不止

麝香

二錢

滑石

木

人中白

各半兩

右同研為散每服二錢熱酒調下一方有銀硃無滑

石每用少許鼻搐之立效

厚樸丸

出聖濟總錄

治鼻衄不止

厚樸

去粗皮

丸礲

并沙薑

糞堆土瓜苗心

右等分搗羅為末蜜為丸如鷄頭大每服三丸葱一握細切麪一匙鹽半錢同炒黃沸湯點下

天竺黃散

出聖濟總錄

治鼻衄不止

天竺黃 芳藪

各一兩

防己

半兩

右搗研為散每服一錢新汲水調下肺損吐血者用



藥二錢七生麵一錢七水調下並食後服

千針散

出聖濟總錄

治鼻衄不止

刺薊

木賊

各一分

白麩

一錢

右為散每服一錢研青蒿心七枚新水調下併二服

五苓散

出如宜方

治夏月伏暑鼻衄不止

澤瀉

二兩半

肉桂

一兩

白朮

猪苓

赤茯苓

各一兩

兩半

右為末同百草霜末茅根煎湯下

又方

出聖惠方

生地黄汁

一升

白蜜

半兩

蒲黃

二兩

右相和微煖過每服一小盞頻服之

三汁飲

出聖惠方

治鼻中血出不斷心欲悶絕

刺薊汁

二合

生地黄汁

一合

生薑汁

半合

右調和令勻徐徐飲之仍將滓塞鼻中

生葛散

出濟生方

治鼻衄不止

生葛根

小薊根

各半觔

右洗淨搗取汁每服一盞溫湯服不據時候

又方

出朱氏集驗方

治鼻衄不止

生蒲黃

二錢

青黛

半錢

右用生藕汁作一服調下一方用井花水調下

又方

出海上方名方

黃藥子 蒲黃

右等分為細末每服二錢新汲水調下

玉粉散

出聖惠方

治鼻衄日夜不止頭痛心煩

石膏 研

牡蠣

旁研令極細  
如粉各一兩

右研勻為散每服二錢新汲水調下候血滴間斷時

再以水調藥如稀糊滴鼻內

鷄蘇散

出聖濟  
總錄

治鼻衄不止

鷄蘇

二兩

防風

去入  
一兩

右為散每服二錢溫水調下更以鷄蘇葉於新水內

揉軟內鼻竅即止

二花散

出聖濟  
總錄

治鼻衄不止

酸石榴花

一分

黃蜀葵花

一錢

右為散每服一錢水一盞煎至六分不據時候溫服

車前散

出聖濟總錄

治鼻衄不止欲死

車前子

末

牛耳中垢

等分

右和成挺子塞鼻中立止

柳枝散

出聖濟總錄

治鼻衄不止

人參

一分

寒食楊柳枝

門旁揄者是也

右為散每服一錢新汲水調下併二服

參蓮散

出聖濟總錄

治鼻衄不止

人參

一錢

蓮子心

一錢

右為散每服一錢新汲水調下

通神散

一名伏龍肝散

治衄血不止心神悶亂頭旋欲倒

出聖

惠方

亂髮燒灰

伏龍肝

等分

右研為散每服三錢新汲水調下

蝸牛散

出聖濟總錄

治血熱衝肺鼻衄不止

蝸牛

焙乾一分

烏賊骨

半錢

右搗研為散含水一口搗一字入鼻內

吹鼻散

出聖濟總錄

治鼻衄血不止

茅花

十莖

亂髮一小團

右燒為末研勻每以少許吹鼻內

又方

出聖惠方

羊脰炭皮

二兩搗碎醋拌燒令通赤

故紙

三十張多年者燒灰

右研細為散以新汲水調下三錢

龍骨散

出聖惠方

治鼻衄不止眩冒欲死吹鼻

龍骨

半兩

亂髮

一鷄子大燒為灰

右研如粉以少許吹入鼻中立止

小梔散

出朱氏集驗方

治鼻衄不止昏悶欲死

右山梔子不據多少燒為細末每用少許吹入鼻中

立止一方用竹刀破作兩邊一邊用濕紙裹煨令熟

一邊生用同研為末酒調服一方曾服燒煉藥方致

鼻血者生用煎湯解之葵手涯云同官無錫監酒趙



疵兄衄血甚已死入殮血尚未止一道人過其門聞其家哭詢問其由道人云是魯服丹或燒煉藥子有藥用之即活囊間出藥半錢七吹入鼻中立良久得活

萊服飲

出危氏方

治鼻衄不止

右用蘿蔔不據多少搗取自然汁每服一盞入鹽少許冷服不據時候或滴汁少許入鼻中亦用藕汁亦可一方無灰酒服

扎指方

出濟生方

治鼻衄不止

右用線緊扎中指中節如左鼻出血扎左手中指中節右鼻出血扎右手中指中節兩鼻出血左右俱扎之

治鼻衄不止

右滑石白帶青色者為末和米飲服之又白茅花無花以根煎湯燕蘇合香丸鷄蘇丸男女皆可服

又方

出海上方

用蘆花燒灰吹少許入鼻內即止

栗灰散

出聖濟總錄

治鼻衄不止

右用宣和大栗子七枚逐一微利破連皮燒存性碗蓋候冷入麝香少許同研每服二錢溫水調下

黃藥散

出肘後方

治鼻衄不止

右黃藥子一兩為散每服二錢煎阿膠湯調下良久以新汲水調生麪一匙投之

法紙散

出聖濟總錄

治鼻衄血出不止

右病人衄血時以紙接血候滴滿紙將紙燈上燒作灰每一張作一服新汲水調下不得令病人知

燈心散

出聖濟總錄

治鼻衄不止

右用燈心一兩焙搗羅為散入丹砂一錢研每服二錢用米飲調服下

當歸散

出聖濟總錄

治鼻衄不止

右用當歸切焙搗羅為散每服一錢米飲調下

大蒜貼足方

一名一金散  
出肘後方

治鼻衄不止諸藥不驗

右用大蒜一枚去皮研細攤作餅子如錢大厚一寸  
許若左竅出血貼於左脚心下綿繫定右竅即貼右  
脚心兩竅俱出即俱貼之血止即以溫水洗脚心令  
去蒜氣一方以摩手心亦可

治鼻衄不止

出聖濟  
總錄

右用元明粉以冷熱水調臨卧服二錢差

又方

出聖  
惠方

右楮葉搗絞取汁一二升漸漸溫飲之即止如未止

再服

治鼻衄不止欲絕者

出經驗良方

右以茅花無以根每服一大把細剉水兩碗煎濃至一碗分二服一方用黃茅根為末米泔水調下

又方

出本草

右萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時時細呷

治鼻衄不止胸中痞悶

出聖惠方

右以生水蘇即鷄蘇五合香豉二合合杵研搓如棗核大內鼻

獨聖散

出肘後方

治鼻衄不止服藥不應

右用糯米微炒黃為末每服二錢新汲水調下

治鼻血出不止

出肘後方

右以醋和糊粉半棗許服

治鼻衄久不止

出聖濟總錄

右以定州白瓷細搗研為末每抄一剗耳許入鼻內

立止

治鼻衄連日夜不止眩暈欲死灌鼻方

出聖惠方

右用青箱草不限多少細剉搗絞取汁一兩合合少灌入鼻中即止一方用子

又方

出聖惠方

用生薑研汁滴入鼻中立止

治鼻衄屢醫不止

出聖惠方

右用栗殼五兩燒灰研為末每服二錢以粥飲調服



神白散

出楊氏家藏方

治鼻衄不止

蛤粉

一兩研羅  
五七遍

槐花

半兩炒合  
焦研為末

右研令極勻細每服一錢新汲水調下小兒只用半

錢兼治便血不止不據時候

寸金散

出衛生寶鑑

治鼻衄不止

石州黃藥子

半兩

土馬駝

牆上有者是

甘草

生各一分

右為細末每服二錢新汲水調下未止再服立止

治鼻衄不止或素有熱而暴作諸藥無驗

出試效方

以白紙一張作八牒或十牒於極冷水內濕紙置頂中熱熨斗熨至一重或二重紙乾乾立止

治鼻衄出血數升不知人

用生茅根取汁每服一合立止

又方


用艾灰吹鼻中

治鼻衄不止

但服洗心散立效

治鼻血不止

用龍鱗薜荔研水飲之大薜荔亦可



普濟方卷一百八十九